

**Kyntheum®** (broadalumabe). Solução injetável para administração subcutânea na concentração de 140 mg/mL, em seringa preenchida de 1,5 mL de uso único. **Registro:** 1.8569.0015. **Indicações:** Tratamento da psoríase em placas, moderada a grave, em pacientes adultos que são elegíveis para terapia sistêmica ou fototerapia. **Contraindicações:** hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. Doença de Crohn ativa. Infecções ativas clinicamente relevantes (por exemplo: tuberculose ativa). **Advertências e precauções:** Não foi estabelecida uma associação causal entre o tratamento com Kyntheum® e o risco acrescido de ideação e comportamento suicida. Os riscos e os benefícios do tratamento com Kyntheum® devem ser cuidadosamente ponderados para os pacientes com antecedentes de depressão e/ou ideação ou comportamento suicida ou para os pacientes que desenvolvam tais sintomas. Recomenda-se precaução ao considerar a utilização de Kyntheum® em pacientes com uma infecção crônica ou com antecedentes de infecções recorrentes. **Categoria de risco na gravidez: B. Interações medicamentosas:** Não devem ser administradas vacinas vivas simultaneamente com Kyntheum®. **Via de administração:** via subcutânea. **Posologia:** A dose recomendada é de 210 mg administrada por injeção subcutânea nas semanas 0, 1 e 2, seguida de 210 mg a cada 2 semanas. **Modo de administração:** Kyntheum® é administrado por injeção subcutânea. Cada seringa preenchida é para uso único. **Reações adversas:** gripe; infecções por unha (incluindo unha do pé, unha versicolor, unha cruris); cefaleia; dor orofaríngea; diarreia, náuseas; artralgia, mialgia; fadiga, reações no local da aplicação (incluindo eritema no local da injeção, dor, prurido e contusão, hemorragia). **Uso adulto. Venda sob prescrição. V02**

**Daivobet®** (calcipotriol monodratado + dipropionato de betametasona). Pomada (50 mcg/g + 0,5 mg/g) e gel (50 mcg/g + 0,5 mg/g). **Registro:** 1.8569.0004. **Indicações:** Daivobet® pomada é indicado para o tratamento tópico da psoríase vulgar. Daivobet® gel é indicado para o tratamento tópico da psoríase do couro cabeludo e da psoríase vulgar leve a moderada no corpo. **Contraindicações:** hipersensibilidade a qualquer componente do produto, distúrbios do metabolismo do cálcio, psoríase eritrodérmica, esfoliativa ou pustulosa, lesões cutâneas de origem viral, infecções cutâneas fúngicas ou bacterianas. **Advertências e precauções:** não utilizar na face ou genitais, nem sob oclusão. Pode ocorrer hipercalcemia com doses acima de 100 g por semana. **Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas:** Daivobet® não deve ser administrado concomitantemente com outros medicamentos tópicos. O uso simultâneo de mais de um produto pode ser prejudicial. **Via de administração:** via dermatológica. **Posologia:** Pomada - aplicar uma vez ao dia na área afetada, por 4 semanas. Se necessário, o uso após este período deve ser feito sob supervisão médica. Gel - aplicar uma vez ao dia nas lesões do couro cabeludo por 4 semanas ou corpo por 8 semanas. Se necessário, o uso após este período deve ser efetuado sob supervisão médica. **Reações adversas:** prurido, irritação da pele, hipercalcemia, fotossensibilidade, atrofia de pele. **Uso adulto. Venda sob prescrição. V03.**

**Daivonex®** (calcipotriol). Pomada (50 mcg/g). **Registro:** 1.8569.0003. **Indicações:** Daivonex® é indicado para o tratamento da psoríase vulgar. **Contraindicações:** alergia ao calcipotriol ou a qualquer substância contida na pomada. Daivonex® também é contraindicado em pacientes com conhecidos distúrbios do metabolismo do cálcio. **Advertências e precauções:** não utilizar na face, uma vez que pode causar irritação da pele. Durante o tratamento com Daivonex®, é aconselhável limitar ou evitar a exposição excessiva à luz solar natural ou artificial. **Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas:** não há interação entre Daivonex® e a luz solar ou ultravioleta. **Via de administração:** via dermatológica. **Posologia:** aplicar duas vezes ao dia na área afetada, pela manhã e à noite. Nos casos de terapia de manutenção, a dose pode ser reduzida. A dose semanal não deve exceder 100 g. **Reações adversas:** irritação da pele, erupção cutânea, sensação de queimação, sensação de picada, pele ressecada, prurido, eritema, dermatite de contato. **Uso adulto. Venda sob prescrição. V02.**

**Advantan®** (aceponato de metilprednisolona). Creme (1 mg/g), loção (1 mg/g) e solução (1 mg/mL). **Registro:** 1.8569.0010. **Indicações:** Advantan® creme é indicado para o tratamento de dermatite atópica, eczema de contato, eczema vulgar, eczema degenerativo, eczema disidrotico, eczema em crianças. Advantan® loção é indicado para o tratamento de eczema exógeno agudo, dermatite atópica e eritema solar. Advantan® solução é indicado para o tratamento de dermatoses inflamatórias e pruriginosas do couro cabeludo. **Contraindicações:** pacientes com presença de processos tuberculosos ou sifilíticos na região a ser tratada, doenças virais, rosácea, e reações cutâneas pós-vacinação na região a ser tratada. **Advertências e Precauções:** não se deve aplicar Advantan® creme e loção sobre as mamas em mulheres lactantes. Uso de Advantan® loção em crianças abaixo de 4 meses de idade não foi estabelecida. Por se tratar de solução inflamável, Advantan® solução não deve ser manuseado em áreas próximas de chamas. Advantan® não deve entrar em contato com os olhos e feridas profundas abertas. **Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas:** Não são conhecidas até o momento. **Reações adversas:** As reações frequentes incluem queimação, prurido, ressecamento, eritema, vesículas, foliculite, erupção, parestesia, hipersensibilidade ao fármaco. **Via de administração:** via dermatológica. **Posologia:** Creme - aplicar uma camada fina do creme uma vez ao dia nas regiões afetadas. A duração do tratamento não deve exceder 12 semanas em adultos e 4 semanas em crianças. Loção - Aplicar uma camada fina da loção uma vez ao dia nas regiões afetadas, friccionando levemente. A duração do tratamento não deve exceder 2 semanas. Solução - aplicar uma vez ao dia, gotejando nas regiões afetadas e friccionar levemente. A duração do tratamento não deve exceder 4 semanas. **Creme - uso adulto e pediátrico. Loção - uso adulto e pediátrico acima de 4 meses. Solução - uso adulto. Venda sob prescrição. V02**

**Protopic®** (tacrolimo). Pomada (0,3 mg/g e 1,0 mg/g). **Registro:** 1.8569.0007. **Indicações:** Protopic® é utilizado no tratamento de dermatite atópica em pacientes que não possuem uma boa resposta ou são intolerantes aos tratamentos convencionais. Protopic® pode ser utilizado na manutenção do tratamento de dermatite atópica. **Contraindicações:** Hipersensibilidade aos macrolídeos em geral, ao tacrolimo ou a qualquer um dos excipientes da formulação. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. **Advertências e precauções:** Protopic® não deve ser utilizado em pacientes com imunodeficiência congênita ou adquirida ou em pacientes fazendo uso de medicamentos que causem imunossupressão. Os pacientes devem minimizar ou evitar a exposição à luz natural ou artificial. Protopic® não deve ser aplicado em lesões que são consideradas como potencialmente malignas ou pré-malignas. Emolientes não devem ser aplicados na mesma área antes de duas horas após a aplicação de Protopic®. O uso de Protopic® em pacientes com defeitos genéticos na barreira epidérmica não é recomendado. **Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas:** A exposição sistêmica a partir da aplicação tópica de tacrolimo pomada é baixa e não se espera que seja afetada pelo uso concomitante de substâncias conhecidas que sejam inibidoras de CYP3A4. **Via de administração:** via dermatológica. **Posologia:** Tratamento: em crianças, o tratamento com Protopic® 0,3 mg/g deve ser iniciado 2 vezes ao dia por até 3 semanas, podendo ser reduzida para uma vez ao dia até o desaparecimento da lesão. Em pacientes a partir de 16 anos, o tratamento deve ser iniciado com Protopic® 1,0 mg/g 2 vezes ao dia até o desaparecimento da lesão. **Manutenção:** Protopic® pomada deve ser aplicado uma vez ao dia, duas vezes por semana nas áreas comumente afetadas pela dermatite atópica para prevenir a progressão da lesão para surtos. Entre as aplicações deve haver um período de 2-3 dias sem tratamento com Protopic®. **Reações adversas:** as reações adversas muito comuns foram queimação e prurido no local de aplicação. As reações comuns foram aquecimento, eritema, dor, irritação, parestesia e erupção no local de aplicação; eczema herpético, foliculite, herpes simples, infecção com o vírus do herpes. As reações incomuns foram acne. Na fase de manutenção os seguintes eventos adversos ocorreram mais frequentemente: impetigo e infecção no local de aplicação. As seguintes reações adversas foram relatadas durante a experiência pós-comercialização: rosácea; neoplasmas benignos, malignos e inespecíficos. **Protopic® 0,3 mg/g - uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Protopic® 1,0 mg/g - uso adulto e pediátrico acima de 16 anos. Venda sob prescrição. V02**

**tacrolimo.** Pomada (0,3 mg/g e 1,0 mg/g). **Registro:** 1.8569.0017. **Indicações:** tacrolimo é utilizado no tratamento de dermatite atópica em pacientes que não possuem uma boa resposta ou são intolerantes aos tratamentos convencionais. Tacrolimo pode ser utilizado na manutenção do tratamento de dermatite atópica. **Contraindicações:** Hipersensibilidade aos macrolídeos em geral, ao tacrolimo ou a qualquer um dos excipientes da formulação. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. **Advertências e precauções:** tacrolimo não deve ser utilizado em pacientes com imunodeficiência congênita ou adquirida ou em pacientes fazendo uso de medicamentos que causem imunossupressão. Os pacientes devem minimizar ou evitar a exposição à luz natural ou artificial. Tacrolimo não deve ser aplicado em lesões que são consideradas como potencialmente malignas ou pré-malignas. Emolientes não devem ser aplicados na mesma área antes de duas horas após a aplicação de tacrolimo. O uso de tacrolimo em pacientes com defeitos genéticos na barreira epidérmica não é recomendado. **Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas:** A exposição sistêmica a partir da aplicação tópica de tacrolimo pomada é baixa e não se espera que seja afetada pelo uso concomitante de substâncias conhecidas que sejam inibidoras de CYP3A4. **Via de administração:** via dermatológica. **Posologia:** **Tratamento:** em crianças, o tratamento com tacrolimo 0,3 mg/g deve ser iniciado 2 vezes ao dia por até 3 semanas, podendo ser reduzida para uma vez ao dia até o desaparecimento da lesão. Em pacientes a partir de 16 anos, o tratamento deve ser iniciado com tacrolimo 1,0 mg/g 2 vezes ao dia até o desaparecimento da lesão. **Manutenção:** tacrolimo pomada deve ser aplicado uma vez ao dia, duas vezes por semana nas áreas comumente afetadas pela dermatite atópica para prevenir a progressão da lesão para surtos. Entre as aplicações deve haver um período de 2-3 dias sem tratamento com tacrolimo. **Reações adversas:** as reações adversas muito comuns foram queimação e prurido no local de aplicação. As reações comuns foram aquecimento, eritema, dor, irritação, parestesia e erupção no local de aplicação; eczema herpético, foliculite, herpes simples, infecção com o vírus do herpes. As reações incomuns foram acne. Na fase de manutenção os seguintes eventos adversos ocorreram mais frequentemente: impetigo e infecção no local de aplicação. As seguintes reações adversas foram relatadas durante a experiência pós-comercialização: rosácea; neoplasmas benignos, malignos e inespecíficos. **Tacrolimo 0,3 mg/g - uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Tacrolimo 1,0 mg/g - uso adulto e pediátrico acima de 16 anos. Venda sob prescrição. V01**

**Azelan®** (ácido azelaico). **MS:** 1.8569.0012. **Indicações:** Gel - tratamento da acne e da rosácea papulopustulosa. Creme - tratamento da acne. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Azelan® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.**

**Fucidin®** (fusidato de sódio). Pomada (20 mg/g). **Registro:** 1.8569.0016. **Indicações:** tratamento tópico de infecções da pele causadas por microorganismos sensíveis ao fusidato de sódio, em particular à bactéria *Staphylococcus aureus*. **Contraindicações:** hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos componentes da fórmula. **Advertências e Precauções:** o uso prolongado ou recorrente pode aumentar o risco de desenvolver resistência bacteriana. Evitar o contato com os olhos. **Categoria de risco na gravidez: B. Interações medicamentosas:** desconhecidas até o momento. **Via de administração:** dermatológica. **Posologia:** aplicar sobre a área afetada de 2 a 3 vezes ao dia por até 7 dias. **Reações adversas:** prurido e erupção cutânea, seguidas por alterações no local da aplicação, como dor e irritação, sendo que todas ocorreram em menos de 1% dos pacientes. Foram relatados hipersensibilidade e angioedema. **Uso adulto e pediátrico. Venda sob prescrição - com retenção de receita.**

**Verutex®** (ácido fusídico). Creme (20 mg/g). **Registro:** 1.8569.0002. **Indicações:** tratamento tópico de infecções da pele causadas por microrganismos sensíveis a este agente anti-infeccioso, em particular a bactéria *Staphylococcus aureus*. **Contraindicações:** hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos componentes da fórmula. **Advertências e Precauções:** evitar o contato com os olhos; não usar em infecções mamárias quando estiver amamentando. **Categoria de risco na gravidez: B. Interações medicamentosas:** desconhecidas até o momento. **Via de administração:** dermatológica. **Posologia:** aplicar sobre a pele afetada, de 2 a 3 vezes ao dia, geralmente por um período de 7 dias. **Reações adversas:** eritema e prurido no local de aplicação. **Uso adulto e pediátrico. Venda sob prescrição - com retenção de receita.**

**Verutex® B** (ácido fusídico + valerato de betametasona). Creme (20 mg/g + 1 mg/g). **Registro:** 1.8569.0001. **Indicações:** tratamento de dermatoses inflamatórias da pele, nas quais existe ou possa existir uma infecção bacteriana, como: eczema atópico, eczema discoide, eczema por estase, dermatite seborreica, dermatite de contato, líquen simples crônico, picadas de insetos. **Contraindicações:** infecções cutâneas primárias causadas somente por bactérias, vírus ou fungos, tuberculose ou sífilis, dermatite e rosácea e hipersensibilidade aos princípios ativos ou a qualquer um dos componentes da fórmula. **Advertências e precauções:** o uso do produto deve ser limitado a 2 semanas. Evitar o contato com os olhos. **Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas:** desconhecidas até o momento. **Via de administração:** dermatológica. **Posologia:** aplicar sobre a área afetada de 2 a 3 vezes ao dia. **Reações adversas:** irritação da pele, prurido, eritema, atrofia da pele, despigmentação e dermatite de contato alérgica. **Uso adulto e pediátrico. Venda sob prescrição - com retenção de receita.**

**Icacort®** (nitrato de isoconazol + valerato de diflucortolona). Creme (10 mg/g + 1 mg/g). **Registro:** 1.8569.0009. **Indicações:** tratamento inicial e temporário das infecções superficiais da pele causadas por fungos, acompanhadas por condições altamente inflamatórias ou eczematosas, como por exemplo, na região das mãos, nos espaços interdigitais dos pés e nas regiões inguinais e genitais. **Contraindicações:** Icacort® é contraindicado nos casos em que o paciente apresenta, na área a ser tratada, doenças virais, dermatite perioral ou rosácea. **Advertências e Precauções:** Nos casos de infecção da pele por bactérias é necessária a utilização de terapia específica. Não deixar o produto entrar em contato com os olhos. Se for aplicado nas regiões genitais, os excipientes petrolato líquido e parafina branca leve, podem causar danos em produtos de látex que atuam como método de barreira, como camisinhas e diafragmas, comprometendo assim sua eficácia. Não existem dados sobre o uso de nitrato de isoconazol e valerato de diflucortolona em mulheres grávidas. A indicação clínica para o tratamento em mulheres grávidas deve ser cuidadosamente avaliada e os benefícios analisados contra os riscos. Mulheres que estejam amamentando não devem utilizar o produto nos seios (vide bula completa do produto). **Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas:** estudos de interações medicamentosas não foram realizados. **Reações adversas:** irritação, queimação, eritema, ressecamento, prurido e vesículas no local da aplicação. As seguintes reações adversas podem ocorrer com corticoides: atrofia da pele, foliculite no local da aplicação, hipertricose, telangiectasia, dermatite perioral, despigmentação da pele, acne e/ou reações alérgicas da pele a qualquer um dos componentes da formulação. Efeitos sistêmicos devido à absorção podem ocorrer quando preparações tópicas contendo glicocorticoides são utilizadas (vide bula completa do produto). **Via de administração:** dermatológica. **Posologia:** aplicar 2 vezes ao dia na região afetada da pele, não ultrapassando 2 semanas de tratamento. **Uso adulto e pediátrico (acima de 5 anos de idade). Venda sob prescrição.**

**Icaden®** (nittrato de isoconazol; isoconazol). Creme (10 mg/g); solução tópica (10 mg/mL). **Registro:** 1.8569.0008. **Indicações:** tratamento de micoses superficiais da pele, (incluindo localizações candidíase, dermatite versicolor). Também é indicado em eritema. **Contraindicações:** contraindicado nos casos de hipersensibilidade conhecida ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. **Advertências e Precauções:** Icaden® não deve entrar em contato com os olhos quando aplicado na face. Icaden® contém álcool cetosteárilico que pode causar reações locais na pele. Icaden® creme é aplicado na região genital, os componentes petrolato líquido e diafragmas, quando estes são utilizados durante o tratamento, diminuindo, portanto, sua efetividade. Ocorrendo ressecamento excessivo da pele durante a terapia com a solução ou spray, recomenda-se o uso adicional de uma formulação oleosa. Mulheres que estejam amamentando devem evitar aplicar nos seios para ingestão do produto por lactente (vide bula completa do produto). **Categoria de risco na gravidez: B. Interações medicamentosas:** estudos de interações medicamentosas não foram realizados. **Reações adversas:** irritação, queimação, ressecamento, prurido, inchaço, fissura, eritema, vesículas no local da aplicação. **Via de administração:** dermatológica. **Posologia:** aplicar uma vez ao dia sobre as áreas afetadas e até por 4 semanas em infecções refratárias (particularmente a infecção dos espaços interdigitais). Para evitar recorrência, o tratamento deve ser continuado por pelo menos mais 2 semanas após a cura clínica. Para a utilização do produto na apresentação de spray, consultar a bula completa do produto. **Creme - uso adulto e pediátrico. Solução tópica - uso adulto. Venda sob prescrição.**